

Mourvèdre précoce

Vass8R12s056-060



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp757


Cl 8 R12 s56-60
Mourvèdre précoce

Mourvèdre précoce

Cl 8 R12 s56-60

Mourvèdre
cuis noir, sphérique
moyenne
sans picole







CLOS 8 RANG 12 Souche 56-60

Désignation : *Maurwidre précoce*

CHARGE : Année :

Véraison : 25.7

Maturité : 12.8.88

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14

L - M - 0

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

EAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 15

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 4 Avec pépins - apyrène

s2 4 JUS : inc. - coloré

s3 5

s4 5

s5 8

DESIGNATION : Mauvèdre précoce mi

EMPLACEMENT : 8 R12 156.60

Date de la vendange : 9.9.86 (+3)

Poids de la vendange : 3,200 kg 800

Nombre de souches : 4 (178g)

Nombre de grappes : 18

Pourriture : 0

Couleur : Noir x4.5 (Ic=0.765)

Indice réfract. : 18.2 (9.9)

Acidité du moût : 3.5

Date : 15.4

Pressurage

Densité : 1018

Date : 22.9

Mise en bouteille

Densité : 995

Degré alcoolique : 10.2

Acidité du vin : 3.2

Date de Dégustation : 02 FEV. 1987

OBSERVATIONS :

note : 2,1
équilibre, bien -

ANNEE 1987

NOM Mauvèdre précoce

EMPLACEMENT 8 R12 156.60

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 2 | 24.1 | 7.4 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3.4 | 7.4 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 31.3 | 3.4 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3.4 | 7.4 | 4 | | 3.6 | 7.6 | 12.6 | 24.7 | 27.7 | 30.7 | 17.8 |
| 5 | 4 | 31.3 | 7.4 | 1 | | | | | | +1 | | 0 |
| | 14 | | 6.4 | 8 | 5.5 | | 7.6 | | | | | |
| | | | +10 | | | | 0 | | | | | |

erige
à 1/2 erige
V-3

ANNEE 1988

NOM Mourvèdre précoce

EMPLACEMENT 8 R 12 A 56-60

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 28.3 | 5.4 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1.4 | 5.4 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5.4 | 8.4 | 5 | 14 | 31.5 | 3.6 | 6.6 | 18.7 | 25.7 | 28.7 | 42.8 |
| 4 | 2 | 5.4 | 8.4 | 5 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 8.4 | 11.4 | 8 | | | | | | | | |
| | | | 8.4 | | | | 3.6 | | | | | |
| | | | +15 | | | | +3 | | | +1 | | -1 |

Pourriture : 0

Port : m'ange

Vigueur : 3 moy.

ANNEE 1989

NOM Mourvèdre précoce

EMPLACEMENT 8 R 12 A 56-60

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 2 | 27.3 | 31.3 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 22.3 | 27.3 | 6 | | 22.5 | 24.5 | | | | | |
| 3 | 6 | 23.3 | 27.3 | 8 | 11 | 22.5 | 24.5 | 30.5 | 17.7 | 24.7 | 31.7 | 41.8 |
| 4 | 4 | 23.3 | 27.3 | 4 | | 24.5 | -3 | | | +1 | | +2 |
| 5 | 4 | 20.3 | 23.3 | 3 | | 24.5 | | | | | | |

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : m'ange

Vigueur : 3

à 27.3.89 +9

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Mourvèdre précoce
8 R 12 s-56-60 (a.57)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.
Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 205 - sans villosité laineuse 206.
Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 1^{ère} et de la 3^{ème} feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 220 -
sans villosité laineuse 221.
Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 226 -
sans villosité laineuse 227.
A limbe plat - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.
A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 240 - sans
villosité laineuse 241.
Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Mourvière précocce

8 R 12 s. 56-60 (257)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.
sans villosité pubescente 250 - sans villosité laineuse 251.
Entièrement - partiellement.

Méridienne : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

♀

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Mourvière précoce

8 R 12 s. 56-60 (s. 58)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre : *Mourwédre précoce*
Désignation : *clo 8 R 12 A. 56-60 (59)*
Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3. (dimensions : *13* x)
24 - Lâche 4 - Moyen 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle blanchâtre 4 - non coloré *5*.

LEI

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière *6* - irrégulière 8. (dimensions : *18* x *48*).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée *7* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *2* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - *sphéroïde 1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - covoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
8 - peu apparent *9*.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins *8* - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière *9*.
A bourrelet évident *1* - peu apparent 2.
A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile *2*.

Calvo 85

DENOMINATION : *Maurvèdre précoc*
EMPLACEMENT : *8 R 12 A 56,60 (A.59)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - *fortement* côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :9... cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Mourvèdre précoce*

Emplacement : *8R12 s. 56-60*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑰ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : ③⑦
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ③⑥ - ③⑦ - ③⑧ - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ②⑦⑦
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④⑦ - 41
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : ④⑤ - ④⑥ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥⑦ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ⑥④ - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües